البحث الثاني

تقرير حالة: موقع نادر للورم السحائي داخل الفم

Hatem Wael Amer, Layla Hafed, Sally Ibrahim, Shady Shaker

الورم السحائي خارج الجمجمة نادر جداً مع الإبلاغ عن حالات قليلة خاصة في تجويف الفم لذلك يعتبر تشخيصه تحدياً بسبب موقع حدوثه غير المعتاد. على حد معرفتنا فأنا نقدم تقرير عن الحالة الأولى للورم السحائي خارج الجمجمة باعتباره ورماً أولياً في الحلق العظمي مع عدم وجود امتداد مكتشف داخل الجمجمة.

حضرت مريضة مصرية تبلغ من العمر ٥٩ عاماً تشكو من تورم كبير غير مؤلم في الجانب الأيمن من الحلق العظمي لمدة ٢٢ عاماً ، والذي لا يمكن رؤيته في الصور الشعاعية.

تم أخذ خزعة قطعية للفحص ، وبعد التقييم باستخدام مجموعة من العلامات المناعية الكيميائية ، تم تشخيص الآفة على أنها ورم سحائي من الدرجة الأولى خارج الجمجمة.

لم تحضر المريضة لعملية الاستئصال الجراحي ولم تتم المتابعة بسبب فقدان الاتصال بالمريضة.

الورم السحائي داخل الفم هو ورم نادر تعتبر العلامات المناعية الكيميائية مهمة لتأكيد هذا التشخيص.