



تقديم معدل إرجاع

الناب بالكتيفة

ذاتية الربط مقارنة بكتيفة تقويم الأسنان العادية

رسالة

مقدمة كجزء من مقومات الحصول على درجة الماجستير في تقويم الأسنان

إلى كلية طب الأسنان للبنات

جامعه الأزهر - فرع البنات

مقدمة من

طبيبة / شرين علي إبراهيم المحلاوي

بكالوريوس طب و جراحة الفم و الأسنان

جامعة القاهرة ٢٠٠٥ م

طبيبة أسنان بجامعة حلوان

قسم تقويم الأسنان

كلية طب الأسنان للبنات

جامعة الأزهر - فرع البنات

١٤٣٥ هجري - ٢٠١٣ ميلادي

المشرفون

أ.د/ سمير عبده إبراهيم

أستاذ و رئيس قسم تقويم الأسنان

كلية طب الأسنان للبنات

جامعة الأزهر

أ.د/ أحمد السيد سلامه

أستاذ تقويم الأسنان

كلية طب الأسنان للبنات

جامعة الأزهر

الملخص العربي

هدف الرسالة:

تهدف هذه الدراسة الي المقارنة بين معدل إرجاع الناب عند إستعمال كثيفة ذاتية الربط من جهة و إستعمال الكثيفة العادية من الجهة الأخرى .

طريقة البحث و المواد المستخدمة :

العينة :

لإنجاز غرض الدراسة الحالية تم إختيار عدد عشرة مرضى من الإناث و ذلك من العيادة الخارجية للتقويم بكلية طب الأسنان للبنات جامعة الأزهر فرع البنات.

تم إختيار المرضى حسب المعايير الآتية :

- (١) تراوحت أعمارالمرضى بين ١٣-٢١ سنة .
- (٢) عدم وجود معالجة تقويمية سابقة .
- (٣) عدم خلع أسنان دائمه .
- (٤) أن يكون مندرج تحت التصنيف الأول لأنجل في سوء إطباق الأسنان و يتطلب خلع الضواحك الأولى .
- (٥) التاريخ المرضي خالي من الأمراض المزمنة.
- (٦) النظافه الجيده للفم.

التسجيلات :

تم أخذ التسجيلات التالية لكل مريض :-

(١) صور فوتغرافية خارجية للوجه .

(٢) صور فوتغرافية داخلية للفم والأسنان .

(٣) قوالب تشخيصية .

(٤) صورة أشعة بانوراما رقمية.

(٥) صورة أشعة سيفالومترية رقمية .

طريقة البحث :

تم خلع الضاحكة الأولى العلوية على الجانب الأيسر و الجانب الأيمن و تم إستخدام كتيفة ذاتية الربط على الناب العلوي من الجانب الأيمن و كتيفة تقليدية من الجانب الأيسر ثم تم جر الناب بإستخدام سلسلة قوة الشد على الجانبين و المعلومات المجمعه من الدراسة الحالية تم جدولتها و تطيلها إحصائياً و تم مناقشتها في ظل الابحاث العلميه المتناوله في هذا الموضوع .

نتائج البحث :

من المناقشة للدراسة الحالية تم استخلاص الإستنتاجات و التوصيات التالية :-

الفائدة الأساسية هي زيادة معدل جر الناب بإستخدام الكتيفة ذاتية الربط و بالتالي تقليل زمن العلاج بوجه عام.

التوصيات :

أوصت دراسه البحث علي إستخدام كتيفه التقويم ذاتيه الربط في المرضي البالغين وذلك لتقليل مدة العلاج التي تكون دائما مطلباً لِح و أساسي في هذا النوع من المضدي .