

الملخص العربي

دراسة مقارنة بين قمل الرأس بين أطفال المدارس الابتدائية في كلا من محافظة المنوفية والفيوم

مقدمة:

تعد الإصابة بالقمل مشكلة صحية عامة متكررة. ويعد نمط وانتشار القمل معتمدا على العديد من العوامل الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية. وهوشائع بين أطفال المدارس وخاصة في المرحلة الابتدائية. مما قد يؤثر على أدائهم الدراسي.

اهداف البحث:

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى انتشار الإصابة بقمل الرأس بين طلبة المدارس الابتدائية، في (منطقتي الفيوم و باجور) واستكشاف العوامل المؤهلة إلى الإصابة بقمل الرأس في كل من المدارس الحكومية والخاصة.

طرق البحث:

كانت الدراسة وصفية مستعرضة ، و قد أجريت في محافظتي الفيوم والمنوفية التي تمثل مصر العليا والسفلى على التوالي خلال العام الدراسي ٢٠١٢-٢٠١٣. وقد تم اختيار الطلاب من خلال أخذ العينات العشوائية الطبقيّة متعددة المراحل من مختلف الدرجات (١٠٩٣٥ طالبا).

النتائج:

كان انتشار قمل الرأس في مجموعة الدراسة (١٦.٧٪). كانت الإصابة عالية في المدارس العامة (٢٠.٧٪) عنها في المدارس الخاصة (٩.٠٤٪) و الفتيات (٢٥.٨٪) أكثر من الفتيان (٦.٢٪) خصوصا الفتيات ذوات الشعر المغطى. كان هناك تأثير اجتماعي وديموغرافي على الإصابة بالقمل مثل الإقامة، ووجود إمدادات للمياه، والأزدحام في عدد غرف المنزل و عدد أفراد الأسرة.

الاستنتاجات:

نستخلص من ذلك أن الإصابة بقمل الرأس مشكلة شائعة في الطفولة و متعلقة بقلة النظافة والحالة الاجتماعية الاقتصادية. هناك حاجة لتعاون الجهود بين الأسرة والمدرسة، والمجتمع، وسائل الإعلام، لخلق البيئة التي تحدد السلوكيات الصحية وتعزيز الصحة

كلمات الدالة للبحث:

أطفال المدارس-قمل الرأس-مدي انتشار-وبائيات