

الملخص العربي

عنوان البحث: جدوى استئصال الثدي كتلة مستديرة كتقنية واحدة في المرحلتين الأوليتين من آفات الثدي الخبيثة لأرباع مختلفة. مستشفى الفيوم الجامعي. دراسة من ٢٥ مريضا.

الهدف : تقنيات أونكوبلاستيك هو وسيلة لزيادة معدل جراحة الحفاظ على الثدي التي يمكنها تجنب تشوهات الثدي والحد من معدل استئصال الثدي. استئصال الثدي كتلة مستديرة واحدة من هذه التقنيات هدفت هذه الدراسة لتقييم جدوى تقنية استئصال الثدي كتلة مستديرة في المرحلتين الأوليتين من آفات الثدي الخبيثة في الأرباع المختلفة.

المرضى والأساليب: شملت هذه الدراسة ٢٥ مريضة من مختلف الفئات العمرية مع كتل الثدي الخبيثة في أرباع الثدي المختلفة كانت معايير اختيار كل هؤلاء المرضى نفس جراحة الثدي المحافظة.

النتائج: هذه الدراسة من ٢٥ مريضة تراوحت أعمارهن من ٢٥ إلى ٥٠ عاما، وكانت مواقع الأورام ٩ مريضة في الربع الخارجي العلوي (٣٦٪) ٥ مريضة في الربع العلوي الداخلي (٢٠٪)، ٧ مريضة في الربع السفلي الخارجي (٢٨٪). و ٤ مريضة في الربع السفلي الداخلي (١٦٪). وكانت أحجام الورم تتراوح ما بين ٥٠ في ٤٠ مم إلى ٢٠ في ٢٠ مم في أحجام مختلفة من الاندواء صغير ومتوسط وكبير . جميع حدود الاستئصال الجراحي كانت سلبية ولم يتم استعمال مصارف في أي مريضة . حدث ارتشاح خلوي في ٣ حالات فقط (١٢ %) وكانت النتيجة ممتازة فيما يتعلق برضى المرضى وشكل ندبه الثدي في ١٢ حالة (٤٨ %) ونتيجة جيدة فيما يتعلق برضى المرضى وشكل ندبه الثدي في ٨ حالات (٣٢ %) ونتيجة عادله مع مرضى غير راضيين في ٥ حالات فقط (٢٠ %).

الاستنتاج: تقنية كتلة مستديرة باعتبارها تقنية أونكوبلاستيك يمكن استخدامها بأمان في جميع الأرباع في الاورام الخبيثة في الثدي، باستثناء الربع المركزي وذيل الإبطي مع نتائج مقبولة من ناحية استئصال الورم والنتائج الجمالية.

الكلمات الرئيسية : استئصال الثدي كتلة مستديرة – الاستئصال التحفظي للثدى – آفات الثدي الخبيثة تى ١ و تى ٢