

البحث الثالث

دراسة مقارنة بين الحقن باستخدام تراي أمسينولون بمفرده والحقن باستخدام خليط من تراي أمسينولون و ٥ فلورويوراسيل لعلاج الندبات المتضخمة والجدرات.

الخلفية : تمثل الندبات المتضخمة والجدرات مشكلة طبية وجمالية ضخمة وهناك طرق علاجية متعددة مقترحة. الحقن باستخدام تراي أمسينولون اثبت انه له تأثير كبير فى علاج الندبات المتضخمة والجدرات وعلى الناحية الاخرى الحقن باستخدام خليط من تراي أمسينولون و ٥ فلورويوراسيل له ايضا تأثير كبير فى الخمسة عشرة ستة الاخيرة فى علاج الندبات المتضخمة والجدرات.

المرضى والطرق: تم اجراء البحث على عشرين افة وكل افة تم حقنها باستخدام تراي أمسينولون بمفرده فى نصف مساحة الافة و الحقن باستخدام خليط من تراي أمسينولون و ٥ فلورويوراسيل فى النصف الاخر من الافة وتم متابعة المرضى لمدة ستة اشهر بعد الحقن الاخير.

النتائج: بعد مقارنة بين الحقن باستخدام تراي أمسينولون بمفرده والحقن باستخدام خليط من تراي أمسينولون و ٥ فلورويوراسيل لعلاج الندبات المتضخمة والجدرات وجد انه كلتا الطريقتين فعاليتين مع افضلية الحقن باستخدام تراي أمسينولون بمفرده خصوصا فى علاج صلابة وعلو الافة كما ان المرضى الذين تم علاجهم باستخدام خليط من تراي أمسينولون و ٥ فلورويوراسيل حدثت لهم مضاعفات مثل زيادة تصبغ الافة وحدوث الم وتقرحات سطحية وكانت هذه المضاعفات اقل مع الحقن باستخدام تراي أمسينولون بمفرده.

الاستنتاج: لقد تبين من هذا البحث ان الحقن باستخدام تراي أمسينولون بمفرده افضل واقل فى المضاعفات من الحقن باستخدام خليط من تراي أمسينولون و ٥ فلورويوراسيل لعلاج الندبات المتضخمة والجدرات.