

### التغير الوبائي لسعفة الرأس بين أطفال المدارس في مصر

يهدف البحث الى تقدير معدل انتشار سعفة الرأس بين طلاب المدارس الابتدائية، في الفيوم، مصر مع تحديد العوامل المسببة في كل من المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة. أجريت دراسة وصفية مستعرضة في اثنتي عشرة مدرسة ابتدائية. وقد تم اختيار الطلاب من مختلف السنوات الدراسية بإجمالي عدد 12128 طالب وطالبة. تم اجراء فحص سريري للشعر وفروة وأخذت عينات الفطريات للفحص المجهرى. كان انتشار سعفة الرأس في مجموعة الدراسة بنسبة 0.4% وأعلى في المدارس العامة عن المدارس الخاصة (73.5% مقابل 26.5% على التوالي). والأولاد أكثر تأثرا من الفتيات بنسبة 5:1 الأولاد إلى نسبة الفتيات. كان نسبة وجود العدوي داخل الأسرة حوالي 40.8% بينما أظهرت 51% الي. تدني المستوي الاجتماعي. يشير البحث الى ظهور نوع اخر غير منتشر كمسبب جديد لسعفة الرأس في مصر بالرغم من انخفاض معدل الأنتشار أقل مما ذكر سابقا.