

Epidemiology of Hepatocellular Carcinoma in Fayoum Governorate-Egypt

Naglaa A. El Sherbiny, SamyZaky, Ahmed A. Gomma, **Essam A. Hassan**, Nancy A. Atta

المشاركون في البحث : - نجلاء الشربيني- سامي زكي -احمد علي جمعه- **عصام علي حسن**-نانسي عطيه

قسم الصحة العامه - كلية الطب - جامعة الفيوم

قسم الأمراض المتوطنة - كلية الطب- جامعة الازهر

قسم الأمراض المتوطنة – كلية الطب –جامعة الفيوم

مكان النشر بحث منشور في

International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) 2017

ملخص البحث

يعد سرطان الخلايا الكبدية (HCC) من الأسباب الرئيسية المسببه للوفاة المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم ، ومن المتوقع أن يزداد عبء هذا المرض في السنوات المقبلة . وقد أصبح سرطان الكبد ثاني أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين الرجال في مصر. تهدف هذه الدراسة إلى تقدير معدل انتشار المرض ، تحديد عوامل خطوره وكذلك الكشف عن السمات السريية لمرض سرطان الكبد في محافظة الفيوم . كانت الدراسة دراسة وصفية مستعرضة أجريت في قسم الامراض المتوطنه في مستشفى جامعة الفيوم . تم استخدام استبيان معد خصيصا للدراسه و فحص سريري شامل مع فحوصات معملية . وقد تبين ان معظم الحالات جاءت من مناطق الريفية ، وشكل المزارعون ٣٩.٣ ٪ من الحالات كذلك ظهر ان أكثر من ٩٠ ٪ من الحالات كانت تعاني من تليف الكبد وأكثر من نصف الحالات تعاني من اصابه بالبلهارسيا كما كان التهاب الكبد الفيروسي C هو المسبب الرئيسي بنسبه ٧٩.٨ ٪ تلاه التهاب الكبد الفيروسي B بنسبه ١٥ ٪